Salinare Wässer im Brandenburger Lockergestein - Identifikation und Herkunftsnachweis

Landesamt für Bergbau,
Geologie und Rohstoffe

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg

2. GEBAH

2.1. Grundlagen

2.2. Genesetypen und Genesediagramm

2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion

2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg

2. GEBAH

2.1. Grundlagen

2.2. Genesetypen und Genesediagramm

2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion

2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg

2. GEBAH

2.1. Grundlagen

2.2. Genesetypen und Genesediagramm

2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion

2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg

2. GEBAH

2.1. Grundlagen

2.2. Genesetypen und Genesediagramm

2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion

2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

Tiefenlage der Quartärbasisfläche
1 : 1 000 000

Quartärbasisfläche

- höher + 100 m NN
- +100 bis ± 0 m NN
- ±0 bis -100 m NN
- 100 bis -200 m NN
- 200 bis -300 m NN
- 300 bis -500 m NN
- tiefer - 500 m NN

1 - 6 Markante Rinnensysteme (mit vorläufiger Bezeichnung)

- 1 "Prignitz-Rinne"
- 2 "Ruppin-Altmark-Rinne"
- 3 "Nauen-Havelländische Rinne"
- 4 "Beelitz-Dreilinden-Tegeler Rinne"
- 5 "Blankensee-Schmöckwitzer (Teltow-) Rinne"
- 6 "Eberswalde-Storkower Rinne"

Verwendete Unterlagen:

CEPEK et al. (1972-1990): Lithofazieskarten Quartär 1: 50 000
 HONEMANN, G.; KÜSTERMANN, W.; MEYER, W.; AHRENS, H.;
 LOTSCH, D.; RUTHSATZ, H. & W. v. BÜLOW (1990): Reflexionsseismische
 Kartierung von Tiefenlagen der Pleistozänbasis im Nordteil der DDR.
 Kurzf. - Nachr. Dtsch. Geol. Ges. **43**, S. 45, Hannover
 HONEMANN, G.; KÜSTERMANN, W. & W. MEYER (1995):
 Reflexionsseismische Kartierung von Tiefenlagen der Pleistozänbasis
 in Nordostdeutschland. - Z. geol. W. **23**, 3 S. 261-275, Berlin
 KUPE TZ, M.; SCHUBERT, G.; SEIFERT, A. & L. WOLF (1990):
 Quartärbasis, pleistozäne Rinnen und Beispiele glazial-kontinentaler
 Lagerungsstörungen im Niederlausitzer Braunkohlengebiet - Geoprofil 1,
 S. 2-17, Freiberg
 LOTSCH, D.; AHRENS, H.; BACHMANN, G. & H. JORTZIG (1982):
 Gesamtschätzung Braunkohle DDR - Gebiet Berlin. - Unveröff. Ber.,
 ZGI Berlin
 RUTHSATZ, H. (1979-1983): Verbreitung, struktureller Bau und Tiefenlage
 der Quartärbasis im Nordteil der DDR. - Unveröff. Ber., ZGI Berlin
 Archivunterlagen des LBGR

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg

2. GEBAH

2.1. Grundlagen

2.2. Genesetypen und Genesediagramm

2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion

2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

Hydrogeologischer Ost-West Schnitt 5810 des Blattes L3548 Strausberg
der HYK 50

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg

2. GEBAH

2.1. Grundlagen

2.2. Genesetypen und Genesediagramm

2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion

2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

GGV	Mobilität
$\geq 0,1$	diffus
$< 0,1 \geq 0,075$	diffus-migrierend
$< 0,075 \geq 0,05$	migrierend
$< 0,05 \geq 0,025$	intrusiv-migrierend
$< 0,025$	intrusiv

RECHLIN 2005, ergänzt HERMSDORF 2010, BROSE 2017

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg

2. GEBAH

2.1. Grundlagen

2.2. Genesetypen und Genesediagramm

2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion

2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg

2. GEBAH

2.1. Grundlagen

2.2. Genesetypen und Genesediagramm

2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion

2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe

Genetische Bewertung von Analysen der Hydrosphäre

GEBAH Version 1.3.07

Programm zur Früherkennung und Bewertung
haltungsgeprägter salinärer Wasser

Autor: Berthold Rechlin, LBGR

Programmentwicklung: Dr. Andreas Hoffnecht, GCI GmbH
mit Beiträgen von Dr. Hubertus Scholz (†), ehem. LGRB
und Dr. Andreas Helms, ehem. LBGR

Landesamt für Bergbau, Geologie
und Rohstoffe Brandenburg (LBGR)

Dieses Programm ist urheberrechtlich geschützt

OK

Autor, Entwickler und Lizenzgeber haften nicht für Schäden jeder Art, die durch Programmfehler, unsachgemäße Nutzung der Software, mangelhafte Eingangsdaten oder Fehlinterpretation der Ergebnisse entstehen. Der Lizenznehmer erklärt mit der Nutzung des Programms GEBAH sein Einverständnis hierzu.

- Grundlage Typendiagramm von Valjašhko (1961)
- Entwicklung Genesemodell 1986
- Seit 2011 als Software verfügbar
- Identifizierung von schon geringfügigen Einflüssen salinärer Tiefenwässer in hydrochemischen Analysen von Proben

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg

2. GEBAH

2.1. Grundlagen

2.2. Genesetypen und Genesediagramm

2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion

2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

- **Vor-Ort:** pH-Wert, Temperatur, Leitfähigkeit
- **Kationen:** K, Na, Mg, Ca, NH_4 , Fe, Mn (ges./gel.)
- **Anionen:** Cl, SO_4 , HCO_3 , NO_2 , NO_3
- **Organische Parameter:** CSV_{Mn} , DOC, UV_{254}

- **Abweichung der Ionenbilanz sollte $e = 1 \%$ nicht überschreiten**

- Berechnung **GGV** und **SMK** sowie anderer Modellsalze entsprechend **Löslichkeit der Ionenverbindungen** beginnend mit schwerlöslichem Salz $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$

- **Repräsentanz der Berechnung mit mathematischen Verfahren überprüft**

Berechnungssalze (BS)

„Aufteilung“ der vorhandenen Ionen auf Ionenverbindungen in der Reihenfolge ihrer Löslichkeit

Beispiel:

Anion	mmol(eq)/l	Berechnungssalz	mmol(eq)/l	Prozent	Rest	mmol(eq)/l
HCO ₃ ⁻	4,4132	Ca(HCO ₃) ₂	3,3932	67,17	Rest HCO ₃ ⁻	1,0200
		Mg(HCO ₃) ₂	0,6494	12,86	Rest HCO ₃	0,3706
		NaHCO ₃	0,3706	7,34	Rest Na ⁺	0,5864
SO ₄ ²⁻	0,0416	KHCO ₃	kein HCO ₃ mehr	0,00		
Cl ⁻	0,5922	NH ₄ HCO ₃	kein HCO ₃ mehr	0,00		
Br ⁻	0,0003	CaSO ₄	kein Ca mehr	0,00		
NO ₃ ⁻	0,0040	MgSO ₄	kein Mg mehr	0,00		
		Na ₂ SO ₄	0,0416	0,82	Rest Na ⁺	0,5448
		K ₂ SO ₄	kein SO ₄ mehr	0,00		
		(NH ₄) ₂ SO ₄	kein SO ₄ mehr	0,00		
		CaCl ₂	kein Ca mehr	0,00		
		MgCl ₂	kein Mg mehr	0,00		
		NaCl	0,5448	10,78	Rest Cl ⁻	0,0474
		KCl	0,0333	0,66	Rest Cl ⁻	0,0141
		NH ₄ Cl	0,0141	0,28	Rest NH ₄ ⁺	0,0280
		...	...	...	...	...
		NH ₄ NO ₃	0,0040	0,08	Rest NH ₄ ⁺	0,0240
		Summe	5,0510	100,00		

Berechnungssalze [%]							
Ca(HCO ₃) ₂	67,17	CaSO ₄	0,000	CaCl ₂	0,000	Ca(NO ₃) ₂	0,000
Mg(HCO ₃) ₂	12,86	MgSO ₄	0,000	MgCl ₂	0,000	Mg(NO ₃) ₂	0,000
NaHCO ₃	7,338	Na ₂ SO ₄	0,824	NaCl	10,78	NaNO ₃	0,000
KHCO ₃	0,000	K ₂ SO ₄	0,000	KCl	0,659	KNO ₃	0,000
NH ₄ HCO ₃	0,000	(NH ₄) ₂ SO ₄	0,000	NH ₄ Cl	0,281	NH ₄ NO ₃	0,081
Karbonate	87,37	Sulfate	0,824	Chloride	11,72	Nitrate	0,081
						Bromide	0,006

Einteilung anhand von Verhältnissen der
Äquivalentkonzentrationen

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg

2. GEBAH

2.1. Grundlagen

2.2. Genesetypen und Genesediagramm

2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion

2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

$\frac{\text{HCO}_3^-}{\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}}$	$\frac{\text{HCO}_3^- + \text{SO}_4^{2-}}{\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}}$	$\frac{\text{HCO}_3^- + \text{SO}_4^{2-}}{\text{Ca}^{2+}}$	Typ	bestimmendes Merkmal
> 1			Natriumtyp („Karbonattyp“)	Karbonatgehalt nicht durch Ca und Mg abgedeckt
< 1	> 1		Sulfattyp	Karbonatgehalt durch Ca und Mg abgedeckt Sulfatgehalt nicht durch Ca und Mg abgedeckt
< 1	< 1	> 1	Magnesiumtyp	Karbonatgehalt und Sulfatgehalt durch Ca und Mg abgedeckt (Ca reicht zur Abdeckung Sulfat allein nicht aus → Rest durch Mg abgedeckt)
< 1	< 1	< 1	Chloridtyp	Karbonatgehalt und Sulfatgehalt durch Ca abgedeckt

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg

2. GEBAH

2.1. Grundlagen

2.2. Genesetypen und Genesediagramm

2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion

2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

desamt für Bergbau,
ologie und Rohstoffe

Hydrogeochemisches Genesemodell
RECHLIN 1997

Chlorid-Werte:

< 5 bis > 250.000 mg/l

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg

2. GEBAH

2.1. Grundlagen

2.2. Genesetypen und Genesediagramm

2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion

2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

Zusammenfassung: Genesetypen und Lagepunkt

- Junge Wässer bewegen sich in Entwicklung vorrangig im Sulfat- und Magnesiumtyp
- Natriumtyp: alte Neubildungswässer; statische Wässer unter (mächtigen) Deckschichten → **gefährdet durch Salzwasserintrusion** (Aufstieg von salinaren Tiefenwässern)
- Eintrag von salinaren Wässern mit **Halit**-Dominanz: LP bewegt sich tendentiell auf NaCl-Pol zu
- erhöhte Anteile des BS NaCl (Halit) erste Indikation für mögliche Salzwasserbeeinflussung:

NaCl (%)	Anwesenheit Halit-Salinar
< 10	nein
10 – 15	möglich
>15	ja

- Prozentualer Anteil NaCl an allen BS → konzentrationsunabhängige Bewertung möglich!

Genetisches Grundverhältnis (GGV)

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg

2. GEBAH

2.1. Grundlagen

2.2. Genesetypen und Genesediagramm

2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion

2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

- Verhältniszahl, um Kalium zu berücksichtigen

- einfache Form: $GGV = \frac{KCl(\%)}{NaCl(\%)}$

- komplexes GGV in GEBAH: $GGV = \frac{\sum K\text{-Salze}(\%)}{NaCl+NaBr+NH_4Cl+FeCl_2(\%)}$

- Wässer mit gleicher Genese haben gleiches GGV.

Bsp.: Meerwasser weltweit: GGV 0,024 – 0,027

- Trennung salinar beeinflusste / nicht beeinflusste Wässer

GGV < 0,1 → Salinarfeld im Diagramm

GGV < 0,05 → deutlich salinar

GGV < 0,01 → Salzwasserstockwerk

- Genetische Prozesse, die sich im GGV widerspiegeln: anthropogene Beeinflussung (Streusalz!), Verwitterung, Sorption, Einfluss durch Halitwässer

Herkunft	Orientierung	Datum	Cl-Wert [mg/l]	GGV
Atlantik Norwegen Fjorde	N	18.06.2005	18.500	0,026
Atlantik Fuerteventura	↓	02.04.2005	21.400	0,025
Atlantik Brasilien	S	03.01.2004	22.200	0,027
Ostsee Zinnowitz	E	16.10.2003	3.700	0,028 !
Ostsee Wustrow	↓	16.04.2004	6.398	0,026
Nordsee Büsum	W	23.07.2002	14.200	0,024
Mittelmeer Zypern	E ↓	17.10.2002	22.928	0,026
Mittelmeer Mallorca	W	18.10.2002	22.006	0,026
Pazifik Kanada	N	22.09.2003	13.300	0,026
Pazifik Ecuador	↓	20.07.2003	19.900	0,027
Pazifik Chile Fjorde	S	16.03.2005	11.800	0,026
Indischer Ozean Mauritius		01.03.2004	20.300	0,027
Rotes Meer Ägypten		06.03.2006	24.200	0,027 !
Südchinesisches Meer Vietnam		01.04.2006	19.000	0,025
Karibik Miami		18.10.2003	17.800	0,024

Salinar-Matrix-Koeffizient (SMK)

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg

2. GEBAH

2.1. Grundlagen

2.2. Genesetypen und Genesediagramm

2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion

2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

- Genetische Prozesse, die sich alle im GGV widerspiegeln: anthropogene Beeinflussung (Streusalz!), Verwitterung, K-Sorption ↔ Einfluss durch Halitwässer → müssen voneinander abgetrennt werden

- genauere Spezifizierung des GGV durch den SMK

- Verhältniszahl „Süßwassersalze“ zu den prägenden Salzen des Salinarstockwerks:

$$SMK = \frac{\text{NaHCO}_3 + \text{MgSO}_4 + \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{MgCl}_2 + \text{K-Salze} + \text{NH}_4\text{-Salze} + \text{NO}_3\text{-Salze} (\%)}{\text{CaCl}_2 + \text{NaCl} + \text{NaBr} (\%)}$$

- SMK betrachtet nur leichter lösliche „Süßwassersalze“, lässt schwerer lösliche *dominante* „Süßwassersalze“ $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$, CaSO_4 weg → reagiert empfindlicher (d. h. auch bei noch hoher Verdünnung) auf Salinareinfluss
- $\text{GGV} < 0,1$ und $\text{SMK} \leq 1$ → Salinareinfluss

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg

2. GEBAH

2.1. Grundlagen

2.2. Genesetypen und Genesediagramm

2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion

2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe

Salinarfeld

GGV < 0,1
SMK ≤ 1

Trennung der nicht salinar von den salinar beeinflussten Wässern

GGV < 0,05
deutliche Ausprägung salinärer Wässer

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg

2. GEBAH

2.1. Grundlagen

2.2. Genesetypen und Genesediagramm

2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion

2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg

2. GEBAH

2.1. Grundlagen

2.2. Genesetypen und Genesediagramm

2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion

2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

2.4. Modul Geneseklassen

- junges Uferfiltrat
- altes Uferfiltrat
- junge, unbeeinflusste Neubildungswässer
- junge, anthropogen beeinflusste Neubildungswässer
- junge Neubildungswässer mit Beeinflussung durch Pyritverwitterung
- junge, versauerte, anthropogen beeinflusste Neubildungswässer
- junge, salinar beeinflusste Neubildungswässer
- junge, versauerte Neubildungswässer
- gealterte, unbeeinflusste Neubildungswässer
- gealterte, anthropogen beeinflusste Neubildungswässer
- gealterte Neubildungswässer mit Beeinflussung durch Pyritverwitterung
- gealterte, versauerte, anthropogen beeinflusste Neubildungswässer
- gealterte, salinar beeinflusste Neubildungswässer
- gealterte versauerte Neubildungswässer
- alte, unbeeinflusste Neubildungswässer
- alte, anthropogen beeinflusste Neubildungswässer
- alte, versauerte anthropogen beeinflusste Neubildungswässer
- alte, salinar beeinflusste Neubildungswässer
- alte, versauerte Neubildungswässer
- statische, unbeeinflusste Grundwässer
- statische, salinar beeinflusste Grundwässer
- salinare Ablaugungswässer
- salinare alkalisierte Wässer
- salinare erdalkalisierte Wässer
- salinare gealterte erdalkalisierte Wässer
- salinare gealterte alkalisierte Wässer
- salinare Gleichgewichtswässer

Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe

- Methode zur Charakterisierung des Entwicklungsprozesses des Grundwasserchemismus in den Lockergesteinsgrundwasserleitern des Norddeutschen Tieflands

Beispiel „Junge anthropogen beeinflusste Neubildungswässer“

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg

2. GEBAH

2.1. Grundlagen

2.2. Genesetypen und Genesediagramm

2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion

2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

Kriterium junge Neubildungswässer

pH	≥	6,5		und
CaCl ₂ + MgCl ₂ + NaCl + KCl	>	15	%	und
NaCl + KCl	<	15	%	oder
K ⁺	>	7	mg/l	oder
NO ₃ ⁻	>	2	mg/l	oder
SO ₄ ²⁻	>	130	mg/l	und
SO ₄ ²⁻	≤	250	mg/l	

Kriterium zur Abgrenzung anthropogen beeinflusste / unbeeinflusste junge Neubildungswässer

Aktivität	Konzentrationserhöhung von Ionen
Düngung mit organischem Dünger	Ca ²⁺ , Mg ²⁺ , Na ⁺ , K ⁺ , SO ₄ ²⁻ , Cl ⁻ , HCO ₃ ⁻ , NH ₄ ⁺ , NO ₂ ⁻ , NO ₃ ⁻
Düngung mit mineralischem Dünger	Ca ²⁺ , Mg ²⁺ , Na ⁺ , K ⁺ , SO ₄ ²⁻ , Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , NH ₄ ⁺
Auftausalze	Mg ²⁺ , Na ⁺ , SO ₄ ²⁻ , Cl ⁻
Hausmüll- und Bauschuttdeponien	Ca ²⁺ , SO ₄ ²⁻ , Cl ⁻ , Borate
Häusliche Abwässer	Na ⁺ , K ⁺ , SO ₄ ²⁻ , Cl ⁻ , NH ₄ ⁺ , NO ₃ ⁻ , HCO ₃ ⁻ , PO ₄ ³⁻

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg

2. GEBAH

2.1. Grundlagen

2.2. Genesetypen und Genesediagramm

2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion

2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg

2. GEBAH

2.1. Grundlagen

2.2. Genesetypen und Genesediagramm

2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion

2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

Legende

Geneseariale

- junge GWN, unbeeinflusst
- junge GWN, unbeeinflusst bis anthropogen beeinflusst
- junge GWN, durch Pyritverwitterung beeinflusst
- gealterte GWN, unbeeinflusst bis anthropogen beeinflusst
- alte GWN, unbeeinflusst bis anthropogen beeinflusst
- statisches GW, unbeeinflusst
- junge GWN bis statisches GW, geogen - salinar beeinflusst
- salinare erdalkalisierte Wässer
- salinare alkalisierte Wässer
- salinare, gealterte, erdalkalisierte Wässer
- salinare, gealterte, alkalisierte Wässer

Wasserwerk Flatow, OHV „Fahrbefehl“ mit GEBAH

Landesamt für Bergbau,
Geologie und Rohstoffe

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg
2. GEBAH
 - 2.1. Grundlagen
 - 2.2. Genesetypen und Genesediagramm
 - 2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion
 - 2.4. Modul Geneseklassen
- 3. Fallbeispiel**

Übersichtskarte des Betrachtungsraumes

Landesamt für Bergbau,
Energie und Rohstoffe

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg
2. GEBAH
 - 2.1. Grundlagen
 - 2.2. Genesetypen und Genesediagramm
 - 2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion
 - 2.4. Modul Geneseklassen
3. Fallbeispiel

Schnitt LBGR 5845
Blatt L 3342 Nauen

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg
2. GEBAH
 - 2.1. Grundlagen
 - 2.2. Genesetypen und Genesediagramm
 - 2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion
 - 2.4. Modul Geneseklassen
3. Fallbeispiel

Tiefenlage der Quartärbasisfläche
1 : 1 000 000

Quartärbasisfläche

- höher + 100 m NN
- +100 m bis ± 0 m NN
- ± 0 m bis -100 m NN
- 100 m bis -200 m NN
- 200 m bis -300 m NN
- 300 m bis -500 m NN
- tiefer - 500 m NN

1 - 6 Markante Rinnensysteme (mit vorläufiger Bezeichnung)

- 1 "Prignitz-Rinne"
- 2 "Ruppin-Altmark-Rinne"
- 3 "Nauen-Havelländische Rinne"
- 4 "Beelitz-Dreilinden-Tegeler Rinne"
- 5 "Blankensee-Schmöckwitzer (Teltow-) Rinne"
- 6 "Eberswalde-Storkower Rinne"

Verwendete Unterlagen:

CEPEK et al. (1972-1990): Lithofazieskarten Quartär 1: 50 000
 HÖNEMANN, G.; KÜSTERMANN, W.; MEYER, W.; AHRENS, H.;
 LOTSCH, D.; RUTHSATZ, H. & W. v. BÜLOW (1990): Reflexionssismische
 Kartierung von Tiefenlagen der Pleistozänbasis im Nordteil der DDR.
 Kurzf. - Nachr. Dtsch. Geol. Ges. 43, S. 45, Hannover
 HÖNEMANN, G.; KÜSTERMANN, W. & W. MEYER (1995):
 Reflexionssismische Kartierung von Tiefenlagen der Pleistozänbasis
 in Nordostdeutschland. - Z. geol. W. 23, 3, S. 261-275, Berlin
 KUPETZ, M.; SCHUBERT, G.; SEIFERT, A. & L. WOLF (1990):
 Quartärbasis, pleistozäne Rinnen und Beispiele glazitektonischer
 Lagerungsstörungen im Niederlausitzer Braunkohlengebiet. - Geoprofil 1,
 S. 2-17, Freiberg
 LOTSCH, D.; AHRENS, H.; BACHMANN, G. & H. JORTZIG (1982):
 Gesamteinschätzung Braunkohle DDR - Gebiet Berlin. - Unveröff. Ber.,
 ZGI Berlin
 RUTHSATZ, H. (1979-1983): Verbreitung, struktureller Bau und Tiefenlage
 der Quartärbasis im Nordteil der DDR. - Unveröff. Ber., ZGI Berlin
 Archivunterlagen des LGRB

Detail des Schnittes 5845 der HYK 50 des LBGR

Hydrogeologischer Ost-West Schnitt 5845 Blatt L3342 Nauen

Legende

- Grundwasserstandslinie
- Salzwasserausstritt an der Oberfläche
- Quartärbasis
- glaziale Lagerungsstörungen
- tektonische Lagerungsstörung

Lithologie

- Muddel, Torf (Holozän, Eem, Holstein)
- Geschiebemergel, Geschiebelehm
- Schluff / Ton
- Schluff-Feinsand-Wechsellagerung
- Feinsand
- Mittel- und Grobsand
- Kies
- Steinschale
- Schluff, stark kohlig (Braunkohlenschluff)
- Sand, stark kohlig
- Braunkohle
- Rupeleinschichten (Schluff, Ton)
- Gips, Anhydrit

Stratigraphische Einstufungen

- qw - Weichsel-Kaltzeit
- qee - Eem-Warmzeit
- qsa - Saale-Kaltzeit
- qhol - Holstein-Komplex
- qel - Elster-Kaltzeit
- trm - mittlere Quarzlande
- tol - oligozäne Glimmersande
- tor - Rupel

Grundwasserleiter

- GWL oberhalb des Grundwasserspiegels
- weitgehend unbedeckter Grundwasserleiterkomplex (GWLK 1)
- GWL 1.1 weitgehend unbedeckter Grundwasserleiter der Urstromtäler und Niederungen
- GWL 1.2 weitgehend unbedeckter Grundwasserleiter der Hochflächen
- weitgehend bedeckter Grundwasserleiterkomplex (GWLK 2)
- GWL 2.0 vorwiegend in den Deckkomplex eingelagerter, lokal nutzbarer Grundwasserleiter
- GWL 2.1 bedeckter gebietspezifischer Grundwasserleiter
- GWL 2.2
- tieferer Grundwasserleiterkomplex (GWLK 3)
- GWL 3.1 Grundwasserleiter/Quartär
- GWL 3.1 Grundwasserleiter/Tertiar

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg
2. GEBAH
 - 2.1. Grundlagen
 - 2.2. Genesetypen und Genesediagramm
 - 2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion
 - 2.4. Modul Geneseklassen
3. Fallbeispiel

Hydrogeologische Karte von Brandenburg		
Hydrogeologischer Ost-West Schnitt 5845 Blatt L3342 Nauen		
Maßstab	L: 1:25 000	H: 1:1000
Bearbeitungsstand	12/217	
Bearbeitung	Walter, A.; Reyes, S.	
Redaktion	Kaboth, U.; Pawlitzky, M.
Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg		

Quartärbasis im Betrachtungsraum

Grundlage LKQ Blatt 1966 und angepasst mit
Bohrungen Datenbank LBGR 2016

Landesamt für Bergbau,
Geologie und Rohstoffe

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg
2. GEBAH
 - 2.1. Grundlagen
 - 2.2. Genesetypen und Genesediagramm
 - 2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion
 - 2.4. Modul Geneseklassen
- 3. Fallbeispiel**

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg
2. GEBAH
 - 2.1. Grundlagen
 - 2.2. Genesetypen und Genesediagramm
 - 2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion
 - 2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

Legende

- GWMS mit GW-Stand in m NN, STM 15.11.2012
- Grundwassergleiche in m NNH (Wasserwerksförderung = 0 m³/d)

Geobasisdaten: DTK25, ©GeoBasis-DE/LGB 2010

**Osthavelländische
Trinkwasserversorgung und
Abwasserbehandlung GmbH**
Potsdamer Straße 32-34, 14612 Falkensee

GCI GmbH Grundwasser Consulting
Ingenieurgesellschaft
Bahnhofstr. 19
15711 Königs Wusterhausen

**Gutachten zur Festsetzung des
Wasserschutzgebietes für das
Wasserwerk Flatow**

**Grundwassergleichenplan der
Stichtagsmessung 15.11.2012 GWL 2.2**

bearbeitet	Datum	Name	Maßstab	Zeichnungsnummer
14.02.2014	14.02.2014	Ziesche	1 : 25.000	GCI-13407.24 - 04
gezeichnet	14.02.2014	Hecht		

Koordinatensystem: ETRS 89 Anlage 4

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg
2. GEBAH
 - 2.1. Grundlagen
 - 2.2. Genesetypen und Genesediagramm
 - 2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion
 - 2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

Hydrogeologischer Profilschnitt WW Flatow

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg
2. GEBAH
 - 2.1. Grundlagen
 - 2.2. Genesetypen und Genesediagramm
 - 2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion
 - 2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

Auswertung nach dem Genesemodell WW Flatow, Brunnen 3 ** 2021-04-15

Beschreibung:
 Probennahmedatum: 15.04.2021 Labor: AGROLAB
 Vorortparameter: pH: 7,5; Lf: 693 [µS/cm]; T: 9,4 °C
 Organische Parameter: DOC: 2,2 [mg/l]; CSV: 0 [mg/l]; UV254: 3,7 [1/m]

Legende
 Lagepunkt Analyse / Näherung: (d=23,3 e=25,4) ○ ○ (d=18,4 e=25,4)
 Lagepunkt GGV / Näherung: (0,023) × × (0,023)
 Lagepunkt SMK / Näherung: (0,3) □ □ (0,3)
 Bewertung ges. Analyse: schlecht
 Bewertungen (Farbe): (gut, mäßig, schlecht)

Bilanz
 Mineralisation: 482,153 mg/l (11,05 mmol/l)
 Ionenbilanz: -0,2099 mmol/l (eq) -3,1191%
 (DVWK 128/1992)

Originalanalyse		
Anionen	[mg/l]	[mmol/l (eq)]
HCO3	240,00	3,9360
SO4	19,600	0,4077
Cl	88,300	2,4901
Br	0,0000	0,0000
NO3	0,0000	0,0000
B	0,0000	0,0000
I	0,0000	0,0000
NO2	0,0000	0,0000
PO4	0,0000	0,0000

Originalanalyse		
Kationen	[mg/l]	[mmol/l (eq)]
Ca	73,600	3,6726
Mg	8,9000	0,7316
Na	49,300	2,1446
K	1,9600	0,0502
NH4	0,3700	0,0205
Ba	0,0000	0,0000
Mn ges.	0,1200	0,0044
Mn ges.	0,1200	0,0044
Fe ges.	<0,003	0,0001
Fe ges.	1,5000	0,0537
Al	0,0000	0,0000
Zn	0,0000	0,0000

Berechnungssalze [%] - Originalanalyse / Näherung					
Ca(HCO3)2	55,48/55,65	CaSO4	0,000/0,000	CaCl2	0,000/0,000
Mg(HCO3)2	3,979/1,977	MgSO4	6,159/5,969	MgCl2	0,915/3,063
NaHCO3	0,000/0,000	Na2SO4	0,000/0,000	NaCl	32,40/32,27
KHCO3	0,000/0,000	K2SO4	0,000/0,000	KCl	0,758/0,755
NH4HCO3	0,000/0,000	(NH4)2SO4	0,000/0,000	NH4Cl	0,310/0,308
Karbonate	59,46/57,63	Sulfate	6,159/5,969	Chloride	34,38/36,40
				Nitrate	0,000/0,000
				Bromide	0,000/0,000

WW Flatow Brunnen 1 genetische Entwicklung

Beschreibung:
 Probennahmedatum: 30.10.2018 Labor: PWU
 Vorortparameter: pH: 7,56; Lf: 550 [µS/cm]; T: 11,1 °C
 Organische Parameter: DOC: 2 [mg/l]; UV254: 3,8 [1/m]

Auswertung nach dem Genesemodell
 WW Flatow, Brunnen 1 ** 2018-10-30

Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg
2. GEBAH
- 2.1. Grundlagen
- 2.2. Genesetypen und Genesediagramm
- 2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion
- 2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

Legende
 Lagepunkt Analyse / Näherung: (d=23,7 e=19,9) ○ (d=26,3 e=27,9)
 Lagepunkt GGV / Näherung: (0,029) × (0,028)
 Lagepunkt SMK / Näherung: (0,4) □ (0,4)
 Bewertung ges. Analyse: **schlecht**
 Bewertungen (Farbe): **(gut, mäßig, schlecht)**

Bilanz
 Mineralisation: 428,450 mg/l (9,45 mmol/l)
 Ionenbilanz: -0,1735 mmol/l (eq) -2,9442%
 (DVWK 128/1992)

Originalanalyse		
Anionen	[mg/l]	[mmol/l (eq)]
HCO3	220,30	3,6129
SO4	27,000	0,5616
Cl	64,000	1,8048
Br	0,0000	0,0000
NO3	0,0000	0,0000
B	0,0000	0,0000
I	0,0000	0,0000
NO2	0,0000	0,0000
PO4	0,0000	0,0000

Originalanalyse		
Kationen	[mg/l]	[mmol/l (eq)]
Ca	69,000	3,4431
Mg	7,8000	0,6412
Na	38,000	1,6530
K	1,8000	0,0461
NH4	0,1400	0,0078
Ba	0,0000	0,0000
Mn ges.	0,0900	0,0033
Mn ges.	0,0900	0,0033
Fe ges.	0,3200	0,0115
Fe ges.	0,3880	0,0139
Al	0,0000	0,0000
Zn	0,0000	0,0000

Berechnungssalze [%] - Originalanalyse / Näherung					
Ca(HCO3)2	59,46/59,62	CaSO4	0,000/0,000	CaCl2	0,000/0,000
Mg(HCO3)2	2,932/0,950	MgSO4	8,139/9,416	MgCl2	0,000/0,660
NaHCO3	0,000/0,000	Na2SO4	1,559/0,000	NaCl	26,99/28,43
KHCO3	0,000/0,000	K2SO4	0,000/0,000	KCl	0,796/0,792
NH4HCO3	0,000/0,000	(NH4)2SO4	0,000/0,000	NH4Cl	0,134/0,133
Karbonate	62,39/60,57	Sulfate	9,698/9,416	Chloride	27,91/30,01
				Nitrate	0,000/0,000
				Bromide	0,000/0,000

Umstellung der Brunnenfahrweise
 seit 11.05.2016

- 1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg
- 2. GEBAH
- 2.1. Grundlagen
- 2.2. Genesetypen und Genesediagramm
- 2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion
- 2.4. Modul Geneseklassen
- 3. Fallbeispiel

WW Flatow Brunnen 2 genetische Entwicklung

Beschreibung:
 Probenahmedatum: 30.10.2018 Labor: PWU
 Vorortparameter: pH: 7,5; Lf: 613 [$\mu\text{S}/\text{cm}$]; T: 11,3 °C
 Organische Parameter: DOC: 2 [mg/l]; UV254: 3,5 [$1/\text{m}$]

Auswertung nach dem Genesemodell
 WW Flatow, Brunnen 2 ** 2018-10-30

Legende
 Lagepunkt Analyse / Näherung: (d=25,9 e=21,4) ○ ○ (d=29,3 e=29,8)
 Lagepunkt GGV / Näherung: (0,031) □ □ (0,029)
 Lagepunkt SMK / Näherung: (0,4) × × (0,4)
 Bewertung ges. Analyse: **schlecht**
 Bewertungen (Farbe): **(gut, mäßig, schlecht)**

Bilanz
 Mineralisation: 519,066 mg/l (11,36 mmol/l)
 Ionenbilanz: -0,1870 mmol/l (eq) -2,6245%
 (DVWK 128/1992)

Originalanalyse		
Anionen	[mg/l]	[mmol/l (eq)]
HCO3	268,50	4,4034
SO4	35,000	0,7280
Cl	74,000	2,0868
Br	0,0000	0,0000
NO3	0,0000	0,0000
B	0,0000	0,0000
I	0,0000	0,0000
NO2	0,0000	0,0000
PO4	0,0000	0,0000

Originalanalyse		
Kationen	[mg/l]	[mmol/l (eq)]
Ca	84,000	4,1916
Mg	9,9000	0,8138
Na	44,000	1,9140
K	2,2000	0,0563
NH4	0,1500	0,0083
Ba	0,0000	0,0000
Mn gel.	0,1460	0,0053
Mn ges.	0,1460	0,0053
Fe gel.	1,1700	0,0419
Fe ges.	1,3590	0,0487
Al	0,0000	0,0000
Zn	0,0000	0,0000

Berechnungssalze [%] - Originalanalyse / Näherung					
Ca(HCO3)2	60,02/60,17	CaSO4	0,000/0,000	CaCl2	0,000/0,000
Mg(HCO3)2	3,033/1,239	MgSO4	8,619/10,15	MgCl2	0,000/0,215
NaHCO3	0,000/0,000	Na2SO4	1,804/0,000	NaCl	25,60/27,30
KHCO3	0,000/0,000	K2SO4	0,000/0,000	KCl	0,806/0,803
NH4HCO3	0,000/0,000	(NH4)2SO4	0,000/0,000	NH4Cl	0,119/0,119
Karbonate	63,05/61,41	Sulfate	10,42/10,15	Chloride	26,53/28,44
				Nitrate	0,000/0,000
				Bromide	0,000/0,000

Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe

Umstellung der Brunnenfahrweise
 seit 11.05.2016

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg
2. GEBAH
 - 2.1. Grundlagen
 - 2.2. Genesetypen und Genesediagramm
 - 2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion
 - 2.4. Modul Geneseklassen
3. Fallbeispiel

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg
2. GEBAH
- 2.1. Grundlagen
- 2.2. Genesetypen und Genesediagramm
- 2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion
- 2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

Hy Flo 2/2008 Hy Flo 1/2009

EM 100

Hy Flo 2/2008
(290m südl., projiziert)

Hy Flo 1/2009
(250m nordl., projiziert)

Lage der Messprofile in Bezug zum
Hydrogeologischen Ost-West Schnitt L3342-5845

- - - Top GWL
- - - Basis GWL
- //// gering mineralisiertes Wasser im GWL 2
- Süß/Salzwassergrenze
($< 10 \Omega\text{m}$, 2000 mg/l NaCl - Äquivalent)

1. Geologische Ausgangssituation in Brandenburg

2. GEBAH

2.1. Grundlagen

2.2. Genesetypen und Genesediagramm

2.3. Indikatoren für Salzwasserintrusion

2.4. Modul Geneseklassen

3. Fallbeispiel

- Mit geophysikalischen Verfahren erfolgte Kartierung der Süß-/Salzwassergrenze im Untergrund
- direkte Identifizierung salinärer Intrusionsbahn nicht möglich
→ dennoch Reduzierung förderbedingter salinärer Speisungsanteile im genutzten HGWL
nötig
- alternative Nutzung des oberen GWL durch Beregnungsbrunnen möglich
- Ziel = langfristigen Sicherstellung der TW-Versorgung durch WW Flatow
lange bevor TVO-Grenzwert Chlorid erreicht
- Umstellung Brunnenfahrweise 05/2016 auf Grundlage
hydrogeochemisch- genetischer Befunde + halbjährliche Überwachung
Förderbrunnen
- weiteren hydrogeochemischen Überwachung Beregnungsbrunnen im
Umfeld WW Flatow.

1/2
2017

Brandenburgische Geowissenschaftliche Beiträge

Grundwasserversalzung in Brandenburg

https://www.geobasis-bb.de/geodaten/lbgr/lbgr_1-2-2017.htm

**Landesamt für Bergbau,
Geologie und Rohstoffe**

Geophysikalische und
hydrochemische
Untersuchungen
zur Grundwasserversalzung
in Brandenburg